

Blandningsinstruktion

Gör så här:

1. Blanda alla preparat i sprutan, utom NoroTec™ mikronäring
2. Ta ut ett prov om 5 liter sprutvätska (vid t ex bottenpluggen)
3. Mät upp och tillsätt passande mängd NoroTec™ mikronäring enligt nedanstående tabell
4. Blanda väl och låt stå i minst 5 minuter, gärna längre
5. Titta i spannen för att se skiktning, flockning eller utfällning
6. Håll innehållet i sprutan, genom silen. Titta efter utfällning
7. Om inga problem upptäcks, håll i NoroTec™ mikronäring i sprutan i passande mängd
8. Behandla!

Vätskemängd liter/ha	Dos NoroTec™ mikronäring liter/ha	Mängd NoroTec™ mikronäring i 5-litersprovet
50 liter	0,5 liter	50 ml
50 liter	1,0 liter	100 ml
50 liter	2,0 liter	200 ml
100 liter	0,5 liter	25 ml
100 liter	1,0 liter	50 ml
100 liter	2,0 liter	100 ml
150 liter	0,5 liter	17 ml
150 liter	1,0 liter	33 ml
150 liter	2,0 liter	66 ml
200 liter	0,5 liter	12,5 ml
200 liter	1,0 liter	25 ml
200 liter	2,0 liter	50 ml
250 liter	0,5 liter	10 ml
250 liter	1,0 liter	20 ml
250 liter	2,0 liter	40 ml